

ALTERNATIVES A LA TORBA


Assaig primavera 2020 – Planter de tomaquera



Joan Manubens, Glòria Colom, Rafaela Cáceres

Condicions experimentals

- Espècie: tomaquera
- Varietat: “Moneymaker”
- **Sembra:** 20/02/2020
- Anàlisi **resultats:** 29/04/2020
- **Durada cicle:** 10 setmanes
- Cultiu en **hivernacle**
- Freqüència reg: 3 vegades al dia
- Durada reg: 7 minuts
- Tres rèpliques per tractament
- Fertilitat pròpia del substrat
(sense fertilitzant afegit)



Materials

3 materials
extrusionats +
compost CB
(50% en volum)



T: torba (control)



Mix V-CB:
sarments de vinya
+ CB



**CPO: compost
vegetal**

(restes d'esporga; farratge
de veça i civada; herba
fresca; serradures de pi;
pols de roca; microorg.
autòctons)



Mix P-CB:
pollancré + CB



**CB: restes
forestals + fracció
sòlida de purí de
boví**




Mix C-CB:
canya americana
+ CB



Germinació

Germinació en alvèol



Determinacions biomètriques



	CB	CPO	T	MIX C-CB	MIX V-CB	MIX P-CB
Alçada mitjana (cm)	11,0	11,6	8,2	2,9	3,2	2,8
Amplada mitjana (cm)	5,6	5,6	4,7	0,8	1,4	1,0

Determinacions biomètriques

 1 MIX V-CB







 2 MIX P-CB

 3 MIX C-CB

 4 CB

 5 CPO

 6 T



Determinacions sobre els substrats



Determinacions sobre els substrats

 1 MIX V-CB


 2 MIX P-CB

 3 MIX C-CB

 4 CB

 5 CPO

 6 T



Determinacions sobre els substrats

 1 MIX V-CB


 2 MIX P-CB

 3 MIX C-CB


 4 CB

 5 CPO

 6 T



Determinacions sobre els substrats



ALTERNATIVES A LA TORBA

Assaig tardor 2020 – Planter d'enciam



Condicions experimentals

- Espècie: enciam
- Varietat: “Morella”
- **Sembra:** 24/09/2020
- Anàlisi **resultats:** 06/11/2020
- **Durada cicle:** 6 setmanes
- Cultiu en **hivernacle**
- Fertilitzant DCM (NPK 7-7-10)
 

- Tres rèpliques per tractament

Safata 1	Safata 2	Safata 3
MIX V-CB 50	MIX V-CB 20	CB
CPO	T	CPO
MIX F-CB	CB	MIX V-CB 20
MIX V-CB 20	MIX F-CB	MIX V-CB 50
CPO	T	MIX F-CB
	MIX V-CB 50	T
Safata 4	Safata 5	Safata 6
MIX V-CB 50	MIX V-CB 20	CB
T	CB	CPO
MIX F-CB	CB	MIX V-CB 20
MIX V-CB 20	MIX F-CB	MIX V-CB 50
CPO	T	MIX F-CB
MIX V-CB 50	MIX F-CB	T
	MIX V-CB 50	MIX F-CB

Materials

3 materials
extrusionats +
compost CB
(≠ proporcions)



T: torba (control)



Mix F-CB: restes forestals + CB
(mescla 20/80 v/v)



CPO: compost vegetal

(restes d'esporga; farratge de veça i civada; herba fresca; serradures de pi; pols de roca; microorg. autòctons)



Mix V-CB 20:
sarments de vinya + CB
(mescla 20/80 v/v)



CB: restes forestals + fracció sòlida de purí de boví




Mix V-CB 50:
Sarments de vinya + CB
(mescla 50/50 v/v)




Germinació


Germinació en alvèol i supervivència (%)




Determinacions biomètriques




Determinacions biomètriques




Determinacions biomètriques



Determinacions sobre els substrats



Determinacions sobre els substrats




Determinacions sobre els substrats

 1 T
 2 CPO

 3 CB
 4 MIX F-CB

 5 MIX V-CB 20
 6 MIX V-CB 50




Determinacions sobre els substrats

 1 T
 2 CPO

 3 CB
 4 MIX F-CB

 5 MIX V-CB 20
 6 MIX V-CB 50




Determinacions sobre els substrats

 1 T
 2 CPO

 3 CB
 4 MIX F-CB

 5 MIX V-CB 20
 6 MIX V-CB 50



ALTERNATIVES A LA TORBA


Assaig primavera 2021 – Planter tomaquera i pebrot



Joan Manubens, Glòria Colom, Rafaela Cáceres

Condicions experimentals

- Espècie: tomaquera pebrotera
- Varietat: “Esquenaverd” “Italià”
- **Sembra:** 18/03/2021 19/03/2021
- Anàlisi **resultats:** 18/05/2021 18/05/2021
- **Durada cicle:** 8 setmanes
- Cultiu en **hivernacle**
- Freqüència reg: 4 vegades al dia
- Durada reg: 5 minuts
- Tres rèpliques per tractament
- Fertilitzant DCM afegit (4g/L)




Materials

<p>TC: torba (control) (torba rectificada)</p>		<p>TE: torba certificada eco (90% torba; 10% perlita)</p>	
<p>CPO: compost vegetal (restes d'esporga; farratge de veça i civada; herba fresca; serradures de pi; pols de roca; microorg. autòctons)</p>		<p>Mix V-CB: sarments de vinya + CB (mescla 20/80 v/v)</p>	
<p>CB: restes forestals + fracció sòlida de purí de boví</p>		<p>S: Substrat mescla commercial (50% escorça pi compostada; 30% restes forestals extrusionades; 20% torba)</p>	


Germinació

- Màxim emergència
- 50% emergència
- Uniformitat

% emergència vs dies post-sembra en tomaquera



% emergència vs dies post-sembra en pebrotera



Determinacions biomètriques







	CPO	CB	MIX V-CB	TE	TC	S
Alçada mitjana (cm)	12,6	14,7	10,7	11,2	11,9	9,2

Determinacions biomètriques




	CPO	CB	MIX V-CB	TE	TC	S
Alçada mitjana (cm)	8,2	8,3	7,4	5,6	6,5	4,8

Determinacions biomètriques




Determinacions biomètriques


Pes fresc (g) - tom




Pes fresc (g) - peb





Pes sec (g) - tom



Pes sec (g) - peb




Determinacions sobre els substrats




Determinacions sobre els substrats

NITRAT




AMONI




Determinacions sobre els substrats

FOSFAT



POTASSI



■ PP 18/03 ■ PP 14/04 ■ PP 18/05